

貝毒プランクトン調査

| | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|-------------|------|----|----|----|
| 調査年月日 | 令和2年4月10日 | | | 単位：cells/mL | | | | |
| 種類 | ／地点番号 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
| | | 北灘 | 家串 | 御荘 | 船越 | 福浦 | 赤水 | 深浦 |
| | 3m水温 (°C) | 16.0 | 17.0 | 17.6 | 16.6 | | | |
| <貝毒プランクトン> | | | | | | | | |
| | アレキサンドリウム属 | 0 | 0.002 | 0.019 | 0 | | | |
| | ギムノディニウム・カテナータム | 0 | 0.063 | 0.012 | 0 | | | |
| | ディノフィシス属 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| <有害プランクトン> | | | | | | | | |
| | カレニア・ミキモトイ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | コクロディニウム・ポリクリコイデス | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ゴニオラックス・ポリグランマ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・採水は0～7m各層で、等量混合海水を1,000倍濃縮検鏡。 ・貝毒種のプランクトンが確認されています。 ・今後の動向に注意してください。 | | | | | | | |

