

貝毒プランクトン調査

| 調査年月日 | 令和4年8月22日 | 単位：cells/mL | | | | 9:00~ |
|-------------------|--|-------------|-------|--------|-------|-------|
| 種類 / 地点番号 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫御荘湾 | ⑬御荘湾 | |
| | 北灘 | 家串 | 柏 | 御荘(平山) | 成川 | |
| 3m水温 (°C) | 25.3 | 27.6 | 27.3 | 27.9 | 27.8 | |
| 珪藻類 | 20 | 10 | 0 | 24 | 40 | |
| <貝毒プランクトン> | | | | | | |
| アレキサンドリウム属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ギムノディニウム・カテナータム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ディノフィシス属 | 0 | 0.080 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | |
| <有害プランクトン> | | | | | | |
| カレニア・ミキモトイ | 3400 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | |
| コクロディニウム・ポリクリコイデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シャトネラ属 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | |
| 種類 / 地点番号 | ⑬ | ⑭ | | | | |
| | 船越 | 深浦 | | | | |
| 3m水温 (°C) | 28.5 | 28.9 | | | | |
| 珪藻類 | 800 | 7,600 | | | | |
| <貝毒プランクトン> | | | | | | |
| アレキサンドリウム属 | 0 | 0 | | | | |
| ギムノディニウム・カテナータム | 0 | 0 | | | | |
| ディノフィシス属 | 0 | 0 | | | | |
| <有害プランクトン> | | | | | | |
| カレニア ミキモトイ | 0 | 0 | | | | |
| コクロディニウム・ポリクリコイデス | 0 | 0 | | | | |
| シャトネラ属 | 0 | 0.007 | | | | |
| 状況 | <p>ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 引き続き北灘では高密度のカレニア・ミキモトイが確認されています。 ※0~7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。</p> <p>【危険濃度】 ディノフィシス属(下痢性貝毒) 500cells/ml カレニア・ミキモトイ(赤潮原因種) 1,000cells/ml シャトネラ属(赤潮原因種) 100cells/ml</p> | | | | | |

