

(3)大豆奨励品種特性表

種 類	早 中 晩	区 分 (銘柄)	品 種 名	来 歴  (育成場所年) (育成所年)	採 用 年 次	栽 培 面 積 (令2)	供 試 年 次	播 種 期	開 花 期	成 熟 期	生 態 型	主 茎 長	分 枝 数	主 茎 節 数	葉 型	伸 長 型	草 型	毛 茸 の 有 無 及 び 色	花 色	熟 莢 色	裂 莢 性
大 豆	中 の 中	中 粒 白 目	タマホマレ	Lee×東山7号 (フジミジロ) (長野総農試 中信試 昭和55年)	昭 55	-	平 18 〜 平 22	6.26	8.5	11.1	III C	53	4.0	12.3	中	有 限	有 限	白	紫	褐	難
	中 の 晩	中 粒 褐 目	フクユタカ	岡大豆× 白大豆3号 (九州農試 昭和55年)	昭 61	253	平 28 〜 令 2	7.07	8.18	11.13	IV C	71	5.1	16.4	円	有 限	有 限	白	紫	淡 褐	中
	晩 の 早	大 粒 黒 大豆	丹波黒	兵庫農試より 取寄せ (大正13年)	昭 3	-	昭 48 〜 昭 52	6.21	8.12	11.27	IV C	67	4.2	14.0	中	有 限	有 限	褐	紫	褐	中

子 実					粗 蛋 白 質	粗 脂 肪	病 害 虫 抵 抗 性				環 境 抵 抗 性				適 地	栽 培 適 性	概 評			
百 粒 重	粒 形	裂 皮	種 皮 色	臍 色			10 a 当 た り 量	紫 斑 病	ウ イ ル ス 病	カ メ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	密 植 適 応 性	耐 肥 性	耐 倒 伏 性			耐 湿 性	蔓 化 の 難 易	遅 播 適 応 性	優 点
31.8	球	微 少	黄	黄	438	中	中	中	中	大	強	強	中	難	中	県 下 全 域	転換畑 向き	早熟 多収 機械 收穫 に適 する	紫斑病 弱	
35.2	球	少	黄 白	淡 褐	461	強	中	中	中	中	中	中	中	中	中	大	県 下 全 域	畑作及 び転換 畑向き	多収 良質 高蛋白	耐倒伏性 中
45.8	扁 球	多	黒	暗 褐	256	-	-	弱	中	中	中	中	弱	中	易	大	県 下 全 域	畑作及 び転換 畑向き	煮豆用 多収	倒伏・ 蔓化が 易 ウイルス 病弱 裂皮多

(注:タマホマレ・フクユタカは転換畑、丹波黒は畑にて調査)