1　水稲・麦・大豆奨励品種特性表

（1）水稲奨励品種特性表

（その１　うるち編）

種類	栽培型	早中晩	品種名	来歴（育成場所 育成年）	採用年次	栽培面積（令2）	供試年次	播種期	田植期	出穂期	成熟期	稈長	穂長	穂数	芒の多少・長短	ふ先色	草型	穂発芽性
					年	ha	年	月.日	月.日	月.日	月.日	cm	cm	本/㎡				
水稲うるち	早期	極早	コシヒカリ	農林22号×農林１号（福井農試 昭和31年）	昭59	4,000	平26～平30	3.24	4.21	7.12	8.15	91	19.3	397	稀・短	黄白	中間	難
		極早	あきたこまち	コシヒカリ×奥羽292号（秋田農試 昭和59年）	平3	2,220	平26～平30	3.24	4.21	7.6	8.9	83	18.5	371	稀・短	黄白	偏穂数	やや難
	短期	極早	あきたこまち	コシヒカリ×奥羽292号（秋田農試 昭和59年）	平3	80	平28～令2	5.24	6.14	8.6	9.12	81	20.5	273	稀・短	黄白	偏穂数	やや難
	普通期	中	ヒノヒカリ	（愛知40号）黄金晴×コシヒカリ（宮崎総合農試 平成元年）	平7	3,900	平27～令元	5.24	6.14	8.24	10.10	80	19.4	307	稀・短	黄白	偏穂重	難
		中	にこまる	西海232号×北陸174号（九州農試 平成20年）	平24	1,400	平27～令元	5.24	6.14	8.27	10.14	85	20.0	284	稀・短	黄白	偏穂重	中
		中	ひめの凜	媛育56号×西海245号（愛媛農水研 平成30年）	令2	123	平27～令元	5.24	6.14	8.29	10.14	78	21.3	317	稀・短	黄白	偏穂数	難
		晩	松山三井	近畿25号×大分三井120号（愛媛農試 昭和28年）	昭28	155	平27～令元	5.24	6.14	8.30	10.17	89	22.0	266	中・中	黄白	偏穂重	やや難

耕種概要	稚苗手植

種類	脱粒性	玄米の色沢・光沢	心白の多少	腹白の多少	玄米 千粒重	玄米 容積重	玄米 粒径	玄米10a当たり重	とう精歩合	品質	食味	諸抵抗性 葉いもち	諸抵抗性 穂いもち	諸抵抗性 白葉枯	諸抵抗性 紋枯	諸抵抗性 耐倒伏性	適地	栽培適性	概評 優点	概評 欠点
					g	g/ℓ	mm	kg	%											
水稲うるち	難	中飴・良	微	微	20.7	844	5.1×3.0	599	90.1	中の上	上の中	弱	弱	中	中	弱	中山間地及び一部平坦地	早期栽培	食味良 穂発芽難 良質	倒伏易 いもち病弱
	難	中飴・良	無	稀	21.6	847	5.0×3.0	566	90.0	中の上	上の中	中	中	やや弱	中	中	平坦地～中山間地 肥沃な沖積土壌	早期栽培 早植栽培	食味良 良質	いもち病中
	難	中飴・良	無	稀	22.7	850	5.3×2.9	486	90.1	中の上	上の中	中	中	やや弱	中	中	平坦地～中山間地 肥沃な沖積土壌	普通期栽培 早植栽培	食味良 良質	いもち病中
	難	中飴・良	稀	稀	22.7	847	5.1×3.0	541	90.6	中の上	上の中	やや弱	やや弱	やや弱	中	中～強	平坦地～中山間地	普通期栽培	食味良	いもち病 やや弱 白葉枯病 やや弱
	難	中飴・良	稀	稀	23.8	851	5.3×3.0	610	92.0	上の中	上の中	やや弱	やや弱	中	中	中	平坦地	普通期栽培	良質 食味良	いもち病 やや弱
	難	中飴・良	稀	稀	23.6	843	5.4×2.8	570	－	上の中	上の中	やや弱	－	－	－	やや強	平坦地	普通期栽培	良質 食味良	いもち病 やや弱
	難	淡飴・良	少	中～多	26.0	849	5.5×3.2	575	91.3	中の中	中の上	中	中	中	強	中	平坦地 全域	普通期栽培	酒造適米	いもち病中 干害弱 稈長