

【作物】

1 品種・田植期別の穂肥施用時期 (出穂期・成熟期は目安)

品種名	田植期	穂肥(出穂20日前)		出穂期	成熟期
		化成444 又はNK特11号	施用量 (10a)		
きぬむすめ	6/1	7/26頃	30kg	8/15頃	9/22頃
	6/10	7/28頃	30kg	8/17頃	9/25頃
ヒノヒカリ	6/10	8/5頃	30kg	8/25頃	10/5頃
	6/20	8/8頃	30kg	8/28頃	10/10頃
にこまる	6/1	8/5頃	30kg	8/25頃	10/7頃
	6/10	8/9頃	30kg	8/29頃	10/12頃
松山三井	6/10	8/11頃	30kg	8/31頃	10/16頃
	6/20	8/15頃	30kg	9/4頃	10/21頃

・その他: 「みのりアップV830号」を使う場合は、出穂25日前に25kg/10a施用(穂肥がゆっくり効く)。

2 水管理について

- 中干し直後: 2~3回走り水を行った後に、間断灌水を行います。
- 幼穂形成期(出穂25日前)~穂ばらみ期: 土壌水分が不足すると収量や品質が低下するので、水分を十分保ちます。
- 出穂期~出穂期以降: 浅水管理(2~3cm)をします。異常高温が続く場合は、かけ流し灌水で地温を下げ、根傷みを防ぎます。
- 登熟期: 灌水して土壌に水分を与えたら、水は溜めずに、足跡に水がたまっている程度(飽水状態)にします。
- 落水期: 落水期は収穫前7日程度としますが、収穫作業に支障のない程度に刈り取り直前まで走り水灌水で土壌水分を保ちます。

3 病害虫防除について

防除時期	病害虫名	農薬名 濃度・使用量 使用時期
8月中 ~下旬 (出穂期前)	いもち病・もみ枯細菌病 ・内穎褐変病・紋枯病・ウ ンカ類幼虫・ツマグロヨ コバイ幼虫・ニカメイチ ユウ・コブノメイガ	アブロードロムタンモンカットエア (750倍 収穫21日前まで) +ブラシンフロアブル (1,000倍 収穫7日前まで) (粉剤の場合: イッカツエース粉剤DL 3~4kg/10a、穂揃期まで)
8月下旬~ (穂揃期 ~傾穂期)	カメムシ類 (ウンカ類、ツマグロ ヨコバイにも有効)	スタークル顆粒水溶剤 (2,000倍 収穫7日前まで)

・その他: コブノメイガが多発した場合は、パダンSG水溶剤1,500倍(収穫21日前まで)で防除して下さい。

また、稲こうじ病は、前年度多発した圃場では菌密度が高いため再発の可能性があり、出穂20~15日前にドイトソルドルーA2,000倍(出穂10日前まで)を予防散布して下さい。他剤との混用はできません。

・カメムシ対策: 出穂2週間位前までに、畦畔・休耕田の草刈りを行って下さい。乳熟期から傾穂期が最も被害が大きく、この時期に当たる出穂10~15日後に防除を実施して下さい。 <松本>

【野菜】

1 さといも

(1) 病害虫防除

ア 疫病

8月は、子芋の肥大、孫芋の着生、その後成熟期を迎えるため感染しやすく、台風の襲来による長時間の降雨により発生が拡大します。発生を確認したら、「ダイナモ顆粒水和剤2,000倍」または「アミスター20フロアブル2,000倍」を散布して下さい。さといもは散布薬剤が付着しにくいので、まくびか10,000倍を加用して下さい。また、葉害を軽減するため、土壌水分や生育状況を観察し、灌水後夕方防除して下さい。

薬剤名	病害名	濃度	使用時期 /回数	特徴
ダイナモ 顆粒水和剤	疫病	2,000倍	収穫21日前まで / 3回	予防及び治療効果がある 高温多湿時葉害を生じる場合がある
アミスター20 フロアブル	疫病	2,000倍	収穫14日前まで / 3回	予防及び治療効果がある 高温多湿時葉害を生じる場合がある

イ ハダニ類

梅雨明け後、発生初期にコロマイト乳剤1,000倍(収穫前日/2回)またはコテツフロアブル2,000倍(収穫7日前/2回)で防除して下さい。

ウ ハスモンヨトウ

8月は多発するため、発生初期にグレーシア乳剤2,000倍(収穫7日/2回)、またはプレバソフロアブル5 2,000倍(収穫前日/3回)、またはマトリックフロアブル2,000倍(収穫7日前/3回)で防除して下さい。

(2) 水管理と追肥

ア 全期マルチ栽培は、晴天が続く場合畝間の土の状態や生育状況をよく観察して灌水して下さい。

イ 日中、溝に水が溜まったままの状態では、水の温度が上がり根傷みの原因となりますので、夕方の灌水に努め、日中には停滞水が残らないよう注意して下さい。

ウ おおなか作業後、8月上・中旬に「化成444」を40kg/10a施用して下さい。

2 やまのいも

(1) 水管理と追肥

8月上旬に、MB粒状固形を80kg/10a施用します。最終追肥が遅れると、芋の形状の乱れが心配されるので注意して下さい。開花後、栄養生長から生殖生長に移行し、吸肥力も8月上旬~9月にかけて最大となります。また、土壌水分のムラ(乾湿の差)をなくし、生育後半まで定期的な灌水により適湿を保つようにします。

(2) 病害虫防除

病害虫名	薬剤防除法		
	使用薬剤	散布濃度・量	使用時期/使用回数
ハダニ類	コロマイト乳剤	1,000倍	収穫7日前/2回
	マイトコーネフロアブル	1,000倍	収穫3日前/1回
ナガイモコガ	プレバソフロアブル5	2,000倍	収穫前日/3回
シロイチモジヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1,000倍	発生初期(ただし収穫前日)/-
炭そ病	ベンコゼブ水和剤	600倍	収穫21日前/4回
	ダコニール1000	1,000倍	収穫30日前/6回

<山口>

【果樹】

1 摘果

着果量に応じた摘果を行い、目標とする大きさの高品質な果実の生産と来年の着花確保を図ります。

(1) 温州みかん

着果量が多く樹勢低下が心配される樹は、先月に全摘果を行った樹冠上部以外の着果部の摘果を始めて下さい。

着果と新梢発生バランスがよい樹は、9月以降に重点を置いた後期摘果を行い、着果ストレスによる果実品質の向上に努めます。樹冠上部を摘果して夏芽を発生させた樹は、ミカンハモグリガ(エカキムシ)の防除を徹底して、健全な結果母枝を確保します。

(2) 中晩柑類

着果量の多い樹は、早急に摘果を行い樹勢維持と果実肥大の促進に努めて下さい。仕上げ摘果は、8月上旬頃までに完了して下さい。

2 灌水

土壌の過乾燥は、果実の生育阻害(小玉果、酸高果実)や樹勢低下を助長するので、適切に灌水を行います。

温州みかんは、葉の巻き具合(葉の萎凋が朝になっても戻らない)、旧葉の落葉状況等をみながら、7日間隔で10~20mm(10~20t/10a)を目安に灌水して、適度な水分ストレスを維持します。

中晩柑類は、高温、土壌乾燥が続けば7日間隔で20~30mm(20~30t/10a)を目安に灌水を行って下さい。

3 病害虫防除

黒点病防除は、前回散布後の累積降水量200~250mm、又は30日の間隔で定期的に薬剤散布して下さい。本病に弱い品種(せとか、清見等)は、散布間隔を短くします。また、伝染源となる枯れ枝は除去して下さい。 <守屋>

【シキミ】

1 病害虫防除

高温期に多発する害虫は適期防除を徹底し、お彼岸出荷に備えて下さい。ダニにはコテツフロアブル2,000倍、アブラムシ・ハマキムシにはスプラサイド乳剤1,500倍、病害対策にはトップジンM水和剤1,000倍を散布して下さい。

防除は、高温時を避けて涼しい時間帯に行って下さい。薬剤は葉裏にかかるよう、ていねいに散布して下さい。



アオバハゴロモの幼虫



ハマキムシの被害と葉の中の幼虫

2 下枝の整理

株元の古枝や細い下枝が込み合ってくると、病害が蔓延したり防除作業がやりにくくなったりします。また、収穫枝の伸張が悪くなるので、適宜切除して風通しを良くして下さい。

3 荷造り

採取した切り枝は、病害葉や古葉、実などを取り除き、出荷先の規格に合わせて、輪ゴムや紐で元を揃えて束ね、日陰で10時間以上、水揚げをして下さい。 <安藤>

【畜産】

(ハエ対策)

ハエの発生は6~7月をピークに8月は若干減少し、秋口に再び増加します。ハエは多数の卵を産んで急速に増加するため、成虫を駆除しても効果が低いので、初期の発生を減らすことと、幼虫への対策を続けることが重要です。以下の対策をお願いします。

- こまめに除糞すること。
- こぼれた餌を掃除し、水漏れ箇所を速やかに修理すること。
- 掃除が難しい場所にはIGR殺虫剤(幼虫の脱皮や羽化を止める薬剤)等を使用。

(ワクモ対策)

ワクモは鳥類に寄生し吸血するダニで、国内の採卵鶏の半数以上の農場で確認されるなど、生産現場に多大な経済損失を与えているため、被害軽減のために以下の対策が必要です。

- 粘着テープでワクモをチェック(ケージの裏側、金具の裏側、隙間など)
- 殺虫剤の散布(長期連続使用を避け、定期的に薬剤の種類を切り替えること)
 - 有効な市販殺虫剤: 有機リン系、カーバメート系、ピレスロイド系殺虫剤など
 - ワクモ専用殺虫剤: ゴッシュ(有効成分: エトキサゾール) エコノサド(有効成分: スピノサド)
- オールアウト後に鶏舎・資材を65℃以上の温水で加熱処理: 動噴(高温高圧洗浄機)等で洗浄し、殺虫剤の踏込消毒槽を併設すること。 <住吉>