

【天気予報】

平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

	平均気温 (°C)	最高気温 (°C)	最低気温 (°C)	降水量 (mm)
2012年	24.0	28.5	20.6	366.5
2013年	23.6	28.0	19.7	450.5
2014年	22.8	27.4	19.0	158.0
1981~2010年	23.9	27.8	20.6	202.4

※気温については、1ヶ月の平均値

【作物】

1 水管理

これからの管理で、最も重要なのが水管理です。根の活力維持に努め、品質の向上に努めましょう。

(1) 出穂期～出穂期以降

浅水管理(2~3cm)をします。異常高温が続くような時は、かけ流し灌水で地温を下げ、根傷みを防ぎます。

(2) 登熟期

灌水して土壌に水分を与えたら、水は溜めずに、足跡に水がたまっている程度(飽水状態)にします。

(3) 落水期

落水期は収穫前7日程度としますが、収穫作業に支障のない程度に刈り取り直前まで走り水灌水で土壌水分を保ちます。

2 病虫害防除

(1) 斑点米カメムシ類、特にミナミアオカメムシによる被害が大きいため、防除を徹底して下さい。

スタークル顆粒水溶剤2,000倍(収穫7日前まで)を使用する場合は、出穂後10~15日頃に散布して下さい。多発時には、1回目防除の7~10日後に追加防除をして下さい。

スタークル粒剤(3kg/10a、収穫7日前まで)を使用する場合は、出穂後7~10日頃に散布して下さい。

スタークル剤はウンカ類、ツマグロヨコバイにも有効です。

(2) いもち病が発生している場合は、速やかにブラシンプロアブル1,000倍(収穫7日前まで)で応急防除をして下さい。



ミナミアオカメムシ(成虫)

(体長12~16mm)

3 収穫準備

コンバイン、乾燥機等の点検を実施して、計画的な作業を行って下さい。

【品種別収穫適期基準】

区分	短期あきたこまち	ヒノヒカリ
出穂後積算温度(°C)	900~1,050	900~1,100
最長稈黄変率(%)	85	85
出穂後日数(日)	33~37	40~46

<真鍋>

【野菜】

1 主な秋まき野菜の作型

作物名	種まき時期	植付け時期	収穫時期	品種
キャベツ	8/中	9/中	1月	彩音
	8/下	9/下	3/中~4/中	夢ごろも
ハクサイ	8/下	9/中	11/下~1月	黄ごころ75
	9/上	9/下	12/中~1月	黄ごころ85
ダイコン	8/下~9/中	—	10/下~12月	耐病総太り
ブロッコリー	8/中~8/下	9/中~9/下	11/中~1/中	おはよう
れんこん	9/上~10/下	—	10/下~3月	ハター、オリス

2 秋まき野菜の栽培上の注意点

(1) 残暑が続く場合、播種や植付け後、土壌を乾燥させないように注意して下さい。

(2) アブラムシ、ネキリムシなど害虫の発生に注意して下さい。

3 播種

(1) 白菜、ブロッコリー、キャベツ等は、128穴のプラグトレイに、専用培土を入れ、1穴に種1粒を播種。プラグ苗は管理が簡単で、植付けも容易にできます。畑への植付けは、本葉3枚程度の頃に行います。

(2) 畑に直接播種する場合は、まき床を均平にします。播種後は十分灌水します。間引きは本葉2~3枚の頃に、病害虫被害のもの、生育が極端に遅いもの、または早いものを間引きます。

<越智>

【栗】

1 収穫

今月の上旬には早生種の日向・丹沢、中旬からは国見・有磨、下旬からは筑波・銀寄の収穫が始まります。収穫前に、園内の草刈を行い、樹冠下はきれいにしておきましょう。

栗の果実は非常に傷みやすく、特に高温にさらされると腐敗が多くなります。収穫は果実温が低い早朝から実施し、午前10時頃までには終わらしましょう。

2 病虫害防除

中晩生種は、モモノゴマダラメイガの産卵が9月上旬頃まで続くので、この時期にもう一度、エルサン乳剤1,000倍で防除します。

3 台風対策

台風で落球しても、毬から果実が見えている状態であれば出荷可能です。台風後速やかに出荷可能な果実を集めます。ただし、未熟果が混ざらないようにして下さい。

倒伏した樹は、若い樹であれば引き起こして支柱等で支えるようにしましょう。成木では、主幹部分に被害がなく、枝折れ、枝裂けがあった場合は、健全なところまで切り戻し、癒合剤を塗布して切口の乾燥や枯れ込みを防止しましょう。

<菊池>

【シキミ】

秋芽伸長期です。新芽に被害を出さないよう適期防除して下さい。黒しみ斑点病にはペンコゼブ600倍、アブラムシ類・グンバイムシ類、ハマキムシ類にはスミチオン乳剤1,000倍、サビダニ類にはコロマイト乳剤2,000倍を散布します。



サビダニの被害葉と新梢



ハマキムシの被害葉(2~3枚綴る)と幼虫(食害)

<日野>

【茶】

1 立枯株の剪除

立枯株がはっきりしてくる時期です。早めに台切りして、周囲からの株張りを待つか、補植を行います。

2 秋肥2回目の施用(9月中旬頃)

1回目の秋肥施用から約2週間ぐらいたってから、えひめ茶有機100を8袋/10a、またはえひめ茶有機グリーン1号を5袋/10a施用し、中耕して土と混和します。

3 山草の敷き込み(9月下旬頃)

除草後、山草等を敷草することで、雑草抑制や土壌水分保持に役立ちます。土づくりのためにも有効です。

<日野>