

(3)大豆奨励品種特性表

| 種 類 | 早 中 晩 | 区 分 (銘柄) | 品 種 名 | 来 歴 (育成場所年) | 採 用 年 次 | 栽 培 面 積 (令4) | 供 試 年 次 | 播 種 期 | 開 花 期 | 成 熟 期 | 生 態 型 | 主 茎 長 | 分 枝 数 | 主 茎 節 数 | 葉 型 | 伸 長 型 (草型) | 毛 茸 の 有 無 及 び 色 | 花 色 | 熟 色 | 裂 莢 性 |
|--------|-------------|-------------------|-------------|--|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大 豆 | 中 の 中 | 中 粒 白 目 | タマホマレ | Lee×東山7号 (フジミジロ) (長野総農試 中信試 昭和55年) | 昭 55 | 0 | 平 18 〜 平 22 | 6.26 | 8.5 | 11.1 | III C | 53 | 4.0 | 12.3 | 中 | 有限 | 白 | 紫 | 褐 | 難 |
| | 中 の 晩 | 中 粒 褐 目 | フクユタカ | 岡大豆× 白大豆3号 (九州農試 昭和55年) | 昭 61 | 377 | 平 29 〜 令 3 | 7.05 | 8.17 | 11.09 | IV C | 75.4 | 4.8 | 16.3 | 円 | 有限 | 白 | 紫 | 淡 褐 | 中 |
| | 晩 の 早 | 大 粒 黒 大豆 | 丹波黒 | 兵庫農試より 取寄せ (大正13年) | 昭 3 | - | 昭 48 〜 昭 52 | 6.21 | 8.12 | 11.27 | IV C | 67 | 4.2 | 14.0 | 中 | 有限 | 褐 | 紫 | 褐 | 中 |

| 子 実 | | | | | 粗 蛋 白 質 | 粗 脂 肪 | 病 害 虫 抵 抗 性 | | | | 環 境 抵 抗 性 | | | | 適 地 | 栽 培 適 性 | 概 評 | | | |
|-------------|--------|--------|-------------|--------|------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------|------------------|------------------|---|----------------------------|--|
| 百 粒 重 | 粒 形 | 裂 皮 | 種 皮 色 | 臍 色 | | | 10 a 当 た り 量 | 紫 斑 病 | ウ イ ル ス 病 | カ メ ム シ 類 | ハ ス モ ン ヨ ト ウ | 密 植 適 応 性 | 耐 肥 性 | 耐 倒 伏 性 | | | 耐 湿 性 | 蔓 化 の 難 易 | 優 点 | 欠 点 |
| 31.8 | 球 | 微 少 | 黄 | 黄 | 438 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 強 | 強 | 中 | 難 | 中 | 県 下 全 域 | 転換畑 向き | 早 多 良 機 械 収 穫 に 適 す る | 熟 取 質 優 れ る | 紫斑病 弱 |
| 35.3 | 球 | 少 | 黄 白 | 淡 褐 | 482 | 強 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 県 下 全 域 | 畑作及 び転換 畑向き | 多 良 高 蛋 白 | 耐倒伏性 中 |
| 45.8 | 扁 球 | 多 | 黒 | 暗 褐 | 256 | - | - | 弱 | 中 | 中 | 中 | 中 | 弱 | 中 | 易 | 大 | 県 下 全 域 | 畑作及 び転換 畑向き | 煮豆用 多 収 | 倒伏・ 蔓化が 易 ウイ ルス 病弱 裂皮多 |

(注:タマホマレ・フクユタカは転換畑、丹波黒は畑にて調査)