

気温が高く、降水量が多いと発病しやすくなります。
出穂25日後頃までが二次感染防止に有効な防除時期です。
平年は過去10ヵ年の平均値です。

2024 年	西条市丹原町					松山市上難波				
	気象		飛散孢子			気象		飛散孢子		
	平均 気温 (℃)	降水 量 (mm)	飛散 孢子 数	半旬 計	半年 半旬 計	平均 気温 (℃)	降水 量 (mm)	飛散 孢子 数	半旬 計	半年 半旬 計
3/16	8.0	15.5	1			8.0	17	1		
3/17	6.3	0.5	1			6.2	0	1		
3/18	5.5	5	0			5.9	4.5	0		
3/19	5.5	0	0			6.4	0	0		
3/20	8.1	0	0	2	7.3	7.7	0	0	2	21.9
3/21	14.4	0	0			13.0	0	0		
3/22	18.3	0	0			15.7	0	0		
3/23	18.9	0	0			16.7	0	0		
3/24	17.6	0	0			16.8	0	0		
3/25	22.1	0	0	0	8.6	19.6	0	0	0	19.2
3/26	20.3	0	0			20.3	0	0		
3/27	16.2	12.5	0			19.4	23.5	0		
3/28	15.2	8.5	0			13.9	8	1		
3/29	10.6	1.5	0			11.4	0	2		
3/30	7.8	0	0			8.3	0	2		
3/31	5.7	0	0	0	11.5	7.3	0	1	6	17.7
4/1	8.0	0	1			10.2	0	0		
4/2	10.5	7	0			10.9	8	6		
4/3	11.3	0.5	0			11.7	0	2		
4/4	10.1	0	0			10.8	0	0		
4/5	10.4	0	0	1	17.9	13.8	0	0	8	28.3
4/6	14.6	0	0			15.0	0	0		
4/7	13.9	0	0			13.4	0	1		
4/8	17.6	0	0			16.7	0	0		
4/9	14.9	0	0			16.5	0	0		
4/10	14.4	0.5	0	0	30.9	17.0	3	0	1	30.2

飛散孢子数調査：

- ・麦圃場に明日山式孢子採集器を設置し、原則毎朝調査。
- ・スライドグラスに付着した孢子を、面積18×18mm分カウント、2枚のスライドグラス分を合計し、飛散孢子数とした。
- ・調査間隔があいた場合は、日数で除し、日別値を求めた。