

1. 判定結果の表示は次のとおりです。

2. 感染好適条件(+)が出現した7日後前後に初発が予想されるので、圃場を見回り発病の有無を調べて下さい。

3. また、同じ観測地点または地域に好適条件が1～2週間の間隔で再び現れるときは、病勢のやや急激な進行が予想されます。

##

[illegible]

	月/日	四国中央	新居浜	西条	今治	大三島	松山	久万	長浜	大洲	瀬戸	宇和	宇和島	近永	御荘	備考
	6/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/12	-	-	-	-	-	+	±	-	-	-	±	-	-	-	
	6/13	-	-	+	-	-	-	±	-	+	-	+	-	-	-	
	6/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	
	6/15	-	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+	±	
	6/16	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	±	+	±	
	6/17	-	+	-	-	-	-	+	-	+	?	+	-	+	-	
	6/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/23	-	-	-	-	-	-	+	-	±	-	-	-	-	-	
	6/24	±	-	-	±	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/25	±	-	±	±	+	-	-	-	±	-	±	-	-	±	
	6/26	-	-	-	-	-	-	-	-	±	-	-	-	-	-	
	6/27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/30	-	-	-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	
	7/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±	-	
	7/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/11	-	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±	-	±	
	7/12	-	-	-	-	-	±	-	±	-	-	-	-	±	-	
	7/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/14	-	-	-	-	-	±	±	±	-	-	-	-	-	-	
	7/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/18	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	
	7/19	-	-	-	-	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7/24	-	-	-	-	-										

◆BLASTAMによる葉いもち感染好適条件出現の判定

[illegible]