

(表2) 主要死因順位別死亡数・率(人口10万対)の年次推移(全国)

年次	1 位		2 位		3 位		4 位		5 位	
	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)
40	脳血管疾患	172,733 (175.8)	悪性新生物	106,536 (108.4)	心疾患	75,672 (77.0)	老衰	49,092 (50.0)	不慮の事故	40,188 (40.9)
45	〃	181,315 (175.8)	〃	119,977 (116.3)	〃	89,411 (86.7)	不慮の事故	43 (33.7)	老衰	39,277 (38.1)
50	〃	174,367 (156.7)	〃	136,383 (122.6)	〃	99,226 (89.2)	肺炎及び 気管支炎	37,462 (33.7)	不慮の事故	33,710 (30.3)
55	〃	162,317 (139.5)	〃	161,764 (139.1)	〃	123,505 (106.2)	〃	39,241 (33.7)	〃	32,154 (27.6)
60	悪性新生物	187,714 (156.1)	心疾患	141,097 (117.3)	脳血管疾患	134,994 (112.2)	〃	51,366 (42.7)	〃	29,597 (24.6)
平2	〃	217,413 (177.2)	〃	165,478 (134.8)	〃	121,944 (99.4)	〃	74,535 (60.7)	〃	32,122 (26.2)
7	〃	263,022 (211.6)	脳血管疾患	146,552 (117.9)	心疾患	139,206 (112.0)	肺炎	79,629 (64.1)	〃	45,323 (36.5)
12	〃	295,484 (235.2)	心疾患	146,741 (116.8)	脳血管疾患	132,529 (105.5)	〃	86,938 (69.2)	〃	39,484 (31.4)
13	〃	300,658 (238.8)	〃	148,292 (117.8)	〃	131,856 (104.7)	〃	85,305 (67.8)	〃	39,496 (31.4)
14	〃	304,568 (241.7)	〃	152,518 (121.0)	〃	130,257 (103.4)	〃	87,421 (69.4)	〃	38,643 (30.7)
15	〃	309,543 (245.4)	〃	159,545 (126.5)	〃	132,067 (104.7)	〃	94,942 (75.3)	〃	38,714 (30.7)
16	〃	320,358 (253.9)	〃	159,625 (126.5)	〃	129,055 (102.3)	〃	95,534 (75.7)	〃	38,193 (30.3)
17	〃	325,941 (258.3)	〃	173,125 (137.2)	〃	132,847 (105.3)	〃	107,241 (85.0)	〃	39,863 (31.6)
18	〃	329,314 (261.0)	〃	173,024 (137.2)	〃	128,268 (101.7)	〃	107,242 (85.0)	〃	38,270 (30.3)
19	〃	336,468 (266.9)	〃	175,539 (139.2)	〃	127,041 (100.8)	〃	110,159 (87.4)	〃	37,966 (30.1)
20	〃	342,963 (272.3)	〃	181,928 (144.4)	〃	127,023 (100.9)	〃	115,317 (91.6)	〃	38,153 (30.3)
21	〃	344,105 (273.5)	〃	180,745 (143.7)	〃	122,350 (97.2)	〃	112,004 (89.0)	老衰	38,670 (30.7)
22	〃	353,499 (279.7)	〃	189,360 (149.8)	〃	123,461 (97.7)	〃	118,888 (94.1)	〃	45,342 (35.9)
23	〃	357,305 (283.2)	〃	194,926 (154.5)	肺炎	124,749 (98.9)	脳血管疾患	123,867 (98.2)	不慮の事故	59,416 (47.1)
24	〃	360,963 (286.6)	〃	198,836 (157.9)	〃	123,925 (98.4)	〃	121,602 (96.5)	老衰	60,719 (48.2)
25	〃	364,872 (290.3)	〃	196,723 (156.5)	〃	122,969 (97.8)	〃	118,347 (94.1)	〃	69,720 (55.5)
26	〃	368,103 (293.5)	〃	196,925 (157.0)	〃	119,650 (95.4)	〃	114,207 (91.1)	〃	75,389 (60.1)
27	〃	370,346 (295.5)	〃	196,113 (156.5)	〃	120,953 (96.5)	〃	111,973 (89.4)	〃	84,810 (67.7)
28	〃	372,986 (298.3)	〃	198,006 (158.4)	〃	119,300 (95.4)	〃	109,320 (87.4)	〃	92,806 (74.2)
29	〃	373,334 (299.5)	〃	204,837 (164.3)	脳血管疾患	109,880 (88.2)	老衰	101,396 (81.3)	肺炎	96,841 (77.7)
30	〃	373,584 (300.7)	〃	208,221 (167.6)	老衰	109,605 (88.2)	脳血管疾患	108,186 (87.1)	〃	94,661 (76.2)
令元	〃	376,425 (304.2)	〃	207,714 (167.9)	〃	121,863 (98.5)	〃	106,552 (86.1)	〃	95,518 (77.2)
2	〃	378,385 (306.6)	〃	205,596 (166.6)	〃	132,440 (107.3)	〃	102,978 (83.5)	〃	78,450 (63.6)
3	〃	381,505 (310.7)	〃	214,710 (174.9)	〃	152,027 (123.8)	〃	104,595 (85.2)	〃	73,194 (59.6)

注) 死因分類の改正により年次別比較には完全な内容の一致をみることはできない。

心疾患 昭和54年以降は、心臓麻痺、心臓衰弱を含む。

腎不全 平成7年以降は、先天性腎不全を含まない。

不慮の事故・自殺 平成7年以降は、後遺症を含まない、等

6 位		7 位		8 位		9 位		10 位	
死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)
肺炎及び	36,663 (37.3)	全結核	22,366 (22.8)	高血圧性 疾患	18,987 (19.3)	自殺	14,444 (14.7)	胃腸炎	12,705 (12.9)
〃	35,142 (34.1)	高血圧性 疾患	18,303 (17.7)	全結核	15,899 (15.4)	〃	15,728 (15.3)	肝硬変	12,898 (12.5)
老衰	29,916 (26.9)	自殺	19,975 (18.0)	高血圧性 疾患	19,831 (17.8)	肝硬変	15,129 (13.6)	全結核	10,567 (9.5)
不慮の事故	29,217 (25.1)	〃	20,542 (17.7)	慢性肝疾患 及び肝硬変	16,490 (14.2)	高血圧症 疾患	15,911 (13.7)	腎炎及びネ フローゼ	10,180 (8.8)
老衰	27,804 (23.1)	〃	23,383 (19.4)	〃	17,174 (14.3)	腎炎及びネ フローゼ	13,521 (11.2)	高血圧症 疾患	12,700 (10.6)
〃	24,187 (19.7)	〃	20,088 (16.4)	腎炎及び ネフローゼ	17,140 (14.0)	慢性肝疾患 及び肝硬変	16,804 (13.7)	糖尿病	9,470 (7.7)
〃	21,493 (17.3)	〃	21,420 (17.2)	肝疾患	17,018 (13.7)	腎不全	16,187 (13.0)	〃	14,225 (11.4)
自殺	30,251 (24.1)	老衰	21,213 (16.9)	腎不全	17,260 (13.7)	肝疾患	16,079 (12.8)	慢性閉塞性 肺疾患	12,841 (10.2)
〃	29,375 (23.3)	〃	22,145 (17.6)	〃	17,690 (14.0)	〃	15,848 (12.6)	〃	13,069 (10.4)
〃	29,949 (23.8)	〃	22,682 (18.0)	〃	18,185 (14.4)	〃	15,480 (12.3)	〃	13,021 (10.3)
〃	32,109 (25.5)	〃	23,449 (18.6)	〃	18,821 (14.9)	〃	15,737 (12.5)	〃	13,626 (10.8)
〃	30,247 (24.0)	〃	24,126 (19.1)	〃	19,117 (15.2)	〃	15,885 (12.6)	〃	13,444 (10.7)
〃	30,553 (24.2)	〃	26,360 (20.9)	〃	20,528 (16.3)	〃	16,430 (13.0)	〃	14,416 (11.4)
〃	29,921 (23.7)	〃	27,764 (22.0)	〃	21,158 (16.8)	〃	16,267 (12.9)	〃	14,357 (11.4)
〃	30,827 (24.4)	〃	30,734 (24.4)	〃	21,632 (17.2)	〃	16,195 (12.8)	〃	14,907 (11.8)
老衰	35,975 (28.6)	自殺	30,229 (24.0)	〃	22,517 (17.9)	〃	16,268 (12.9)	〃	15,520 (12.3)
不慮の事故	37,756 (30.0)	〃	30,707 (24.4)	〃	22,743 (18.1)	〃	15,969 (12.7)	〃	15,359 (12.2)
〃	40,732 (32.2)	〃	29,554 (23.4)	〃	23,725 (18.8)	慢性閉塞性 肺疾患	16,293 (12.9)	肝疾患	16,216 (12.8)
老衰	52,242 (41.4)	〃	28,896 (22.9)	〃	24,526 (19.4)	〃	16,639 (13.2)	〃	16,390 (13.0)
不慮の事故	41,031 (32.6)	〃	26,433 (21.0)	〃	25,107 (19.9)	〃	16,402 (13.0)	〃	15,980 (12.7)
〃	39,574 (31.5)	〃	29,063 (20.7)	〃	25,101 (20.0)	〃	16,443 (13.1)	大動脈瘤及 び解離	16,105 (12.8)
〃	39,029 (31.1)	腎不全	24,776 (19.8)	自殺	24,417 (19.5)	大動脈瘤及 び解離	16,423 (13.1)	慢性閉塞性 肺疾患	16,184 (12.9)
〃	38,306 (30.6)	〃	24,560 (19.6)	〃	23,152 (18.5)	〃	16,887 (13.5)	〃	15,756 (12.6)
〃	38,306 (30.6)	〃	24,612 (19.7)	〃	21,017 (16.8)	〃	18,145 (14.5)	肝疾患	15,773 (12.6)
〃	40,329 (32.4)	誤嚥性肺炎	35,788 (28.7)	腎不全	25,134 (20.2)	自殺	20,465 (16.4)	血管性等の 認知症	19,546 (15.7)
〃	41,238 (33.2)	〃	38,460 (31.0)	〃	26,081 (21.0)	血管性等の 認知症	20,521 (16.5)	自殺	20,031 (16.1)
誤嚥性肺炎	40,385 (32.6)	不慮の事故	39,184 (31.7)	〃	26,644 (21.5)	〃	21,394 (17.3)	アルツハイ マー病	20,730 (16.8)
〃	42,746 (34.6)	〃	38,133 (30.9)	〃	26,948 (21.8)	アルツハイ マー病	20,852 (16.9)	血管性及び 詳細不明の 認知症	20,815 (16.9)
〃	49,488 (40.3)	〃	38,355 (31.2)	〃	28,688 (23.4)	〃	22,960 (18.7)	〃	22,343 (18.2)