

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和7年9月3日		単位：cells/mL		9:00～
種類 / 地点番号	⑨		⑩	⑪	⑫御荘湾
	北灘	北灘(0m)	家串	柏	御荘(平山)
5m水温 (°C)	27.2		28.3	28.3	27.8
珪藻類	0	0	0	0	7
メソディニウム・ルブラム	280	2,360	101	2	8
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属	0	0	0	0	0
ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0	0
ディノフィシス属	0	0	0.002	0.002	0.001
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0	0
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0	0
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0	0	0
シャトネラ属	0	0	0	0	0
種類 / 地点番号	⑬御荘湾		⑭		
	成川	船越	深浦		
5m水温 (°C)	28.0	29.4	29.0		
珪藻類	0	1,420	1,260		
メソディニウム・ルブラム	1	7	30		
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属	0	0	0		
ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0		
ディノフィシス属	0	0.010	0.005		
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ	0	0	50		
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	2		
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0		
シャトネラ属	0	0	0		
状況	北灘でメソディニウム・ルブラムによる着色がみられています。また、深浦でカレニア・ミキモトイが50cells/mL確認されました。 ※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。				
	【危険濃度】 ディノフィシス属(下痢性貝毒) 500cells/mL カレニア・ミキモトイ(赤潮原因種) 1,000cells/mL コクロディニウム・ポリクリコイデス(赤潮原因種) 300cells/mL				

