

チュウゴクアミガサハゴロモに対しては以下の農薬を使用して防除を行ってください。

以下に記載した農薬はチュウゴクアミガサハゴロモに対して登録はありませんが、植物防疫法第29条第1項の規定による防除を行うために使用が可能です。

また、使用にあたっては購入した農薬の適用作物、使用方法、使用時期、散布液量、希釈倍数、使用回数を守ることで、出荷停止等、流通に支障が出ることはありません。

かき

農薬の名称	使用方法	希釈倍数	使用時期	散布液量	本剤の使用回数
ダントツ水溶剤	散布	2000倍	収穫7日前まで	200～700L/10a	3回以内
アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤	散布	2000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内
アドマイヤー水和剤	散布	1000倍	収穫7日前まで(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	200～700L/10a	3回以内
アークリン水和剤	散布	1000倍	収穫30日前まで	200～700L/10a	3回以内
テルスター水和剤	散布	1000倍	収穫14日前まで	200～700L/10a	2回以内
テルスターフロアブル	散布	3000倍	収穫3日前まで	200～700L/10a	2回以内

かんきつ

農薬の名称	使用方法	希釈倍数	使用時期	散布液量	本剤の使用回数
ダントツ水溶剤	散布	2000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内
アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤	散布	2000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内
アドマイヤーフロアブル	散布	2000倍	収穫14日前まで(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	200～700L/10a	3回以内
アークリン水和剤	散布	2000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内
テルスター水和剤	散布	1000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内
テルスターフロアブル	散布	3000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内

なし

農薬の名称	使用方法	希釈倍数	使用時期	散布液量	本剤の使用回数
ダントツ水溶剤	散布	2000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内
アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤	散布	2000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内
アドマイヤー水和剤	散布	1000倍	収穫3日前まで(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	200～700L/10a	2回以内
アークリン水和剤	散布	1000倍	収穫14日前まで	200～700L/10a	3回以内
テルスター水和剤	散布	1000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	2回以内
テルスターフロアブル	散布	3000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	2回以内

ぶどう

農薬の名称	使用方法	希釈倍数	使用時期	散布液量	本剤の使用回数
ダントツ水溶剤	散布	2000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内
アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤	散布	2000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内
アドマイヤー水和剤	散布	1000倍	収穫21日前まで(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	200～700L/10a	2回以内
アドマイヤーフロアブル	散布	5000倍	収穫21日前まで(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	200～700L/10a	2回以内
テルスター水和剤	散布	1000倍	収穫14日前まで	200～700L/10a	1回
テルスターフロアブル	散布	4000倍	収穫14日前まで	200～700L/10a	1回

もも

農薬の名称	使用方法	希釈倍数	使用時期	散布液量	本剤の使用回数
ダントツ水溶剤	散布	2000倍	収穫7日前まで	200～700L/10a	3回以内
アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤	散布	2000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	3回以内
アドマイヤーフロアブル	散布	5000倍	収穫3日前まで(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	200～700L/10a	2回以内
アークリン水和剤	散布	2000倍	収穫14日前まで	200～700L/10a	3回以内
テルスター水和剤	散布	1000倍	収穫14日前まで	200～700L/10a	2回以内
テルスターフロアブル	散布	3000倍	収穫前日まで	200～700L/10a	2回以内

樹木類 ※アルバリン・スタークル顆粒水溶剤はつつじ類、つばき類を除く

農薬の名称	使用方法	希釈倍数	使用時期	散布液量	本剤の使用回数
テルスター水和剤	散布	1000倍	発生初期	200～700L/10a	6回以内
アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤	散布	2000倍	発生初期	100～700L/10a	5回以内