

(3)大豆奨励品種特性表

種 類	早 中 晩	区 分 (銘柄)	品 種 名	来 歴 (育 成 場 所 育 成 年)	採 用 年 次	栽 培 面 積 (令7)	供 試 年 次	播 種 期	開 花 期	成 熟 期	生 態 型	主 茎 長	分 枝 数	主 茎 節 数	葉 型	伸 長 型	(草 型)	毛 茸 の 有 無 及 び 色	花 色	熟 莢 色	裂 莢 性
大 豆	中 の 中	中 粒 白 目	タマホマレ	Lee×東山7号 (フジミジロ) (長野総農試 中信試 昭 和 55 年)	年 昭 55	ha 0	年 平 18 ↳ 平 22	月.日 6.26	月.日 8.05	月.日 11.01	ⅢC	cm 53.2	本 4.0	節 12.3	中	有限		白	紫	褐	難
	中 の 晩	中 粒 褐 目	フクユタカ	岡大豆× 白大豆3号 (九 州 農 試 昭 和 55 年)	年 昭 61	216	令 3 ↳ 令 7	7.11	8.22	11.08	ⅣC	71.6	4.3	14.3	円	有限		白	紫	淡 褐	中
	晩 の 早	大 粒 黒大豆	丹 波 黒	兵庫農試より 取寄せ (大 正 13 年)	年 昭 3	-	昭 48 ↳ 昭 52	6.21	8.12	11.27	ⅣC	67	4.2	14.0	中	有限		褐	紫	褐	中

子 実						粗 蛋 白 質	粗 脂 肪	病虫害抵抗性				環 境 抵 抗 性					適 地	栽 培 適 性	概 評		
百 粒 重	粒 形	裂 皮	種 皮 色	臍 色	10 a 当 た り 量			紫 斑 病	ウ イ ル ス 病	カ メ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	密 植 適 応 性	耐 肥 性	耐 倒 伏 性	耐 湿 性	蔓 化 の 難 易			遅 播 適 応 性	優 点	欠 点
31.8	g 球	微 く 少	黄	黄	kg 471	% 41.6	% 20.5	中	中	中	中	大	強	強	中	難	中	県 下 全 域	転換畑 向 き	早 熟 多 収 良 質 機械収 穫に適 する	紫斑病 弱
32.7	球	少	黄 白	淡 褐	504	44.3	20.2	強	中	中	中	中	中	中	中	中	大	県 下 全 域	畑作及 び転換 畑向き	多 収 良 質 高蛋白	耐倒伏性 中
45.8	扁 球	多	黒	暗 褐	256	—	—	—	弱	中	中	中	中	弱	中	易	大	県 下 全 域	畑作及 び転換 畑向き	煮 豆 用 多 収	倒伏・ 蔓化が 易 ウイルス病弱 裂皮多

(注:タマホマレ・フクユタカは転換畑、丹波黒は畑にて調査)